



OSPEDALE GENERALE DI ZONA "SAN CAMILLO" TREVISO

CHIRURGIA AMBULATORIALE DELLA MANO

RESPONSABILE: DR. BRUNO BREDA

Segreteria

Tel.: 0422 428 235

Fax: 0422 428 265

SCHEMA DI SOSPENSIONE ED EMBRICATURA DI ANTICOAGULANTE ORALE CON COUMADIN IN PREVISIONE DI INTERVENTO CHIRURGICO



Per il Sig.

Che verrà sottoposto ad intervento di Chirurgia della Mano si propone il seguente schema di sospensione degli anticoagulanti dicumarolici e sostituzione in embriatura con EBPM si consiglia il seguente schema terapeutico:

Giorno			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data			ALTO RISCHIO MENO DI 60 KG.	ALTO RISCHIO PIÙ DI 60 KG.	BASSO RISCHIO MENO DI 60 KG.	BASSO RISCHIO PIÙ DI 60 KG.
1		Sospensione COUMADIN Controllo INR	CLEXANE 4000 X 2	CLEXANE 6000 X 2	CLEXANE 4000	CLEXANE 6000
2			CLEXANE 4000 X 2	CLEXANE 6000 X 2	CLEXANE 4000	CLEXANE 6000
3			CLEXANE 4000 X 2	CLEXANE 6000 X 2	CLEXANE 4000	CLEXANE 6000
4		Controllo INR	CLEXANE 4000 X 2	CLEXANE 6000 X 2	CLEXANE 4000	CLEXANE 6000
5		Intervento	CLEXANE 4000 X 2	CLEXANE 6000 X 2	CLEXANE 4000	CLEXANE 6000
6			CLEXANE 4000 X 2	CLEXANE 6000 X 2	CLEXANE 4000	CLEXANE 6000
7		COUMADIN dose 1 volta e mezzo la terapia abituale	CLEXANE 4000 X 2	CLEXANE 6000 X 2	CLEXANE 4000	CLEXANE 6000
8		COUMADIN dose 1 volta e mezzo la terapia abituale Controllo INR	CLEXANE 4000 X 2	CLEXANE 6000 X 2	CLEXANE 4000	CLEXANE 6000
9		Affidamento centro di riferimento	CLEXANE 4000 X 2 Fino a range terapeutico	CLEXANE 6000 X 2 Fino a range terapeutico	CLEXANE 4000 Fino a range terapeutico	CLEXANE 6000 Fino a range terapeutico

PAZIENTI AD ALTO RISCHIO EMBOLICO (CHADS2; se presenti 2 o più di queste condizioni: Insuff. Cardiaca, Ipertensione, Età 65/75, Diabete, TIA o Stroke x2)

Treviso, ____ / ____ / _____

Il Responsabile U.O.
Dr. Bruno Breda