



## PROCEDURE ENDOSCOPICHE E RISCHIO DI EMORRAGIA

### Procedure ad alto rischio emorragico:

- asportazione di polipi
- ERCP con esecuzione di sfinterotomia
- dilatazione pneumatica e/o meccanica per acalasia o stenosi viscerali
- trattamento con Argon beam
- terapia delle varici esofagee
- posizionamento di gastrostomia endoscopica percutanea (PEG)
- ecoendoscopia con biopsia con ago fine

### Procedure a basso rischio emorragico:

- esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS) con o senza biopsie
- rettosigmoidoscopia e colonscopia con o senza biopsie
- ERCP con inserzione o sostituzione di protesi biliare e/o pancreatiche senza sfinterotomia
- inserzione di endoprotesi viscerali
- ecoendoscopia diagnostica

### **Nella nostra struttura attualmente sono considerati gli esami di:**

- asportazione di polipi
- esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS) con o senza biopsie
- rettosigmoidoscopia e colonscopia con o senza biopsie

***I PAZIENTI IN TERAPIA CON ANTICOAGULANTI SONO INVITATI A CONSULTARE IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE AL FINE DI POTER SOSPENDERE IL FARMACO E PROCEDERE AD ADEGUATA SOSTITUZIONE PRIMA DELLA ESECUZIONE DI ESAMI ENDOSCOPICI***

Lo schema proposto per la sostituzione è il seguente:

1. L'anticoagulante deve essere sospeso 5 giorni prima dell'esame, e sostituito con **eparina a basso peso molecolare s.c.** (enoxaparina 4000 Unità)
2. Il giorno prima dell'esame deve essere eseguito controllo **di INR**, che deve risultare *non* superiore a **1.8**, e comunicato al servizio di endoscopia digestiva.
3. dopo l'esame, il paziente può riprendere **l'assunzione di warfarina mantenendo l'eparina a basso peso molecolare per altri 5 giorni.**
4. Alla fine di tale periodo, deve essere nuovamente controllato il valore dell'INR.

**IN PROSPETTIVA DELL'ESAME DI GASTROSCOPIA E/O DI COLONSCOPIA , SENTIRE IL PROPRIO MEDICO: PER SOSPENDERE EVENTUALE TERAPIA ANTIAGGREGANTE (CARDIOASPIRINA, ASPIRINETTA) ALMENO 7 GG PRIMA DELL'ESAME.**

**Se si è in terapia antiaggregante doppia** per una patologia cardiovascolare ad alto rischio (parlarne con il proprio medico curante) (es.: Cardioaspirina + Plavix) occorre concordare con lo specialista cardiologo o con il proprio medico curante le eventuali modificazioni terapeutiche per la sospensione di uno o entrambi i farmaci.

Per entrambi gli esami: Bisogna evitare di assumere farmaci contenenti ferro o carbone nei tre giorni che precedono l'esame.

### **COSA È NECESSARIO FARE PER ESEGUIRE L'ESAME IN SICUREZZA?**

- ▶ finire sempre la preparazione secondo le istruzioni: un intestino pulito infatti è il requisito fondamentale per poter svolgere bene l'esame e non avere limiti di visualizzazione. Mai autoridursi la quantità di liquidi da bere; se non si riesce a bere tutto, contattare il proprio medico di famiglia
- ▶ avvertire della presunta o accertata gravidanza